



ЕСЛИ ВАШ МАЛЫШ РОДИЛСЯ НЕДОНОШЕННЫМ ИЛИ БОЛЬНЫМ...

Недоступность материнского молока для больного, недоношенного, маловесного ребенка значительно повышает риски развития состояний, угрожающих жизни и здоровью малыша:

В случае кормления смесью вместо материнского молока вероятность развития сепсиса возрастает на 33%, менингита на 20% (*Hylander, Strobino, Dhannireddy 1998*)

В 2,5 раза возрастает риск развития некротизирующего энтероколита (*Qigley, Henderson, Anthony, McGuire 2009*)

В 3,9 раза чаще развиваются тяжелые гипернатриемия и обезвоживание (*Davanzo 2007*)

Вероятность развития септицемии тем выше, чем больше дней прошло от рождения до первого кормления материнским молоком (*Ronnestad 2005*)

Кормление глубоко недоношенных детей смесью, даже специализированной, вместо грудного молока, значительно увеличивает необходимость ребенка оставаться на парентеральном питании (*Cristofalo EA et al 2013*)

Если у матери нет молока

Во многих странах мира созданы банки донорского молока. Основными получателями молока являются клиники по выхаживанию больных и недоношенных новорожденных.

В некоторых странах, таких как Норвегия и Бразилия, донорское молоко доступно каждому недоношенному или больному новорожденному. В других - США, Великобритания, Германия - идет упорная борьба за каждую каплю донорского молока, чтобы спасти больше детских жизней.

Нигде в современном мире непредставима ситуация, когда при наличии молока у родной матери отдавалось бы предпочтение смеси при выхаживании ребенка

Из бутылочки сосать легче?

Прикладывание к груди - лучший способ начать оральное кормление.

Кормление недоношенных из бутылочки может вызывать сбои сердечного и дыхательного ритмов, снижение уровня кислорода в крови (*Blaymore Bier 1997, Chen et al 2000, Mier & Anderson 1987, Poets, Langner & Bohnhorst 1997*)

Предпочтительным методом является переход от зондового кормления непосредственно к грудному (с использованием альтернативных способов докорма, если необходимо) (*Bell, Geyer, Jones 1995*)

Способность ребенка эффективно высасывать молоко из груди гораздо сильнее зависит от регулярности тренировки практических навыков, чем от гестационного возраста (*Mier 2001*).

Тренироваться сосать грудь тяжело и вредно?

Чтобы научиться, надо начать. Даже в случае с очень слабым ребенком первые попытки кормления это просто контакт «кожа к коже» в области материнской груди.

Контакт «кожа к коже»

Метод, который сохраняет жизни тысячам больных и недоношенных детей во всем мире.

Ранний регулярный контакт «кожа к коже» стабилизирует дыхание и сердцебиение ребенка, помогает поддерживать оптимальную температуру тела, снимает стресс, способствует быстрому росту и набору веса (*Moore, Anderson, Bergman 2007; Быстрова 2008*)